

AMAZONAS

ESTADO DO ACRE

VEGETAÇÃO

AMAZONAS

PERU

RONDÔNIA

BOLÍVIA

COBERTURA VEGETAL

NATURAL ANTRÓPICA

A - REGIÕES FITOECOLÓGICAS OU TIPOS DE VEGETAÇÃO

I - REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSE (FLORESTA TROPICAL PLUVIAL) - D

FORMAÇÕES/SUBFORMAÇÕES

Ddu1 Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel uniforme

Dde1 Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel emergente

II - REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA (FACIÇÕES DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSE) - A

Ddu2 Floresta Ombrófila Densa das Terças Baixas com dossel uniforme

Dde2 Floresta Ombrófila Densa das Terças Baixas com dossel emergente

Dsa Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente

Vegetação Secundária **VsD**

Pecuária (pastagem) **ApD**

Florestamento/Reflorestamento com seringueira **RsD**

Área de Influência Urbana **IuD**

FORMAÇÕES/SUBFORMAÇÕES

Asp1 Floresta Ombrófila Aberta Aluvial com palmeiras

Asd Floresta Ombrófila Aberta Aluvial com cipós

Abp Floresta Ombrófila Aberta das Terças Baixas com palmeiras

Abd Floresta Ombrófila Aberta das Terças Baixas com cipós

Abb1 Floresta Ombrófila Aberta das Terças Baixas com bambus

Vegetação Secundária **VsA**

Pecuária (pastagem) **ApA**

Área de Influência Urbana **IuA**

NATURAL ANTRÓPICA

III - REGIÃO DA CAMPANARANA (CATINGA DA AMAZÔNIA, CATINGA-GUAPÍ E CAMPINA DA AMAZÔNIA) - L

FORMAÇÕES/SUBFORMAÇÕES

Lsa Campanarana Arbustiva sem palmeiras

C - ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA OU CONTATOS FLORÍSTICOS

I - CONTATO CAMPANARANA / FLORESTA OMBRÓFILA (ENCRAVES) - LO

FORMAÇÕES/SUBFORMAÇÕES (PREDOMÍNIO)

Loa1 Floresta Ombrófila Densa das Terças Baixas com dossel emergente

Lsa1 Campanarana Florestada sem palmeiras

NOTA EXPLICATIVA

Pelo Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira adotado pelo IBGE, e para esta escala, o mapeamento da vegetação do Estado do Acre mostra a ocorrência de três Regiões Fitoecológicas ou Tipos de Vegetação, áreas bastante conservadas: Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical Pluvial), Floresta Ombrófila Aberta (Facições da Floresta Ombrófila Densa) e Campanarana (Catinga da Amazônia, Catinga-Guapí e Campina da Amazônia). Além desses principais Tipos de Vegetação ocorrem também Áreas de Tensão Ecológica ou Contatos Florísticos; no caso, o contato, na forma de encrave, é da Campanarana com a Floresta Ombrófila. As regiões florestais, entretanto, apresentam amplo domínio.

Cada Região Fitoecológica é composta por formações e subformações, de acordo com a fisionomia e o ambiente onde se encontram. Assim, a Floresta Ombrófila Densa mostra as formações Aluvial, das Terças Baixas e Submontana, cujas subformações ora se apresentam com fisionomia de árvores emergentes, ora com dossel uniforme. A Floresta Ombrófila Aberta, considerada a principal Região Fitoecológica da área, ocorre com as formações Aluvial e das Terças Baixas, destacando fisionomias ou subformações onde ora predominam bambus, ora palmeiras, e às vezes cipós. A Campanarana, de ocorrência bem mais restrita, apresenta-se com fisionomias variando de Gramíneo-Lenhosa a Florestada, sendo que no mapa só é destacada a fisionomia principal de Campanarana Arbustiva, sem palmeiras.

No mapa estão também indicadas as Áreas Antrópicas, destacando-se entre elas as áreas utilizadas com Pecuária (pastagem), a principal atividade agrícola do estado. Em bom com pouca representação, a Vegetação Secundária é uma tipologia muito frequente, ocorrendo de forma associada, em praticamente todas as áreas ocupadas por pastagens e principalmente ao longo das ocupações ribeirinhas, nas planícies das principais rios da região, onde se alterna com faixas florestais naturais e tratos agrícolas de subsistência.

Obs.: Para esclarecimentos adicionais e informações complementares consultar a Nota Técnica, anexa ao mapa, disponível em www.ibge.gov.br

NOTA DE CRÉDITO


Mapa e nota explicativa elaborados a partir da atualização das cartas 1:250.000, do Manual Técnico da Vegetação Brasileira - IBGE, em interpretações de imagens de satélites Landsat TM e ETM+, de 1991 a 1998 e trabalho de campo realizado em 1998, pelo grupo de Vegetação, na Unidade Estadual do IBGE em Goiás - Gerência de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, no âmbito do Projeto de Sistematização das Informações sobre Recursos Naturais, da Diretoria de Geociências.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO


Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS

LOCALIZAÇÃO DO ESTADO



ARTICULAÇÃO DA FOLHA



LOCALIDADES

CAPITAL

CIDADE

VILA

Posto, lugarejo

Propriedade rural

Áreas indígenas

RODOVIAS

Autostada

Pavimentada

Não pavimentada

Outras estradas

Caminho

ELEMENTOS DE HIDROGRAFIA

Curso d'água

permanente

intermitente

Lago, lagoa

permanente

intermitente

Ribeira, barragem

Cachoeira

Condado

Ile

Baía

Porto, land

Base cartográfica elaborada a partir de folhas topográficas e planimétricas integrantes do Sistema Cartográfico Nacional, na escala 1:250.000, com atualização parcial de elementos através de imagens de satélites Landsat TM 5 e 7 obtidas no período de 1991 a 1998, em atendimento ao contrato IBGE/CISCEA (Projeto SINAM).

PROJEÇÃO POLICÔNICA

Escala 1:1.000.000

20 15 10 5 0 10 20 Km

Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais

O IBGE agradece a gentileza da comunicação de eventuais falhas verificadas

neste mapa, através do tel.: 0800-218181, ou por e-mail: ibge@ibge.gov.br.

1ª edição

© IBGE 2005

Direitos de Reprodução Reservados